

Số: /UBND-TTĐVNN
V/v tăng cường công tác kiểm
tra, phòng trừ châu chấu tre
lưng vàng hại cây trồng

Bình Gia, ngày 29 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bình Gia đã xuất hiện châu chấu tre lưng vàng phá hại rừng tre, vầu, nứa, mai tại 03 thôn: Thâm Khôn, Ba Biền, Yên Hùng của xã Thiện Hòa, với mật độ cao 600 - 1000 con/bụi, ăn trụi lá, diện tích phá hại 10 ha. Hiện tại, đang bắt đầu di chuyển từ trên đồi cao xuống các khe suối, bờ bụi và bắt đầu xuất hiện gây hại cây ngô mật độ 50 - 60 con/m² (diện tích 01 ha) châu chấu đang giai đoạn tuổi 3 - 4. Ban ngày tập chung ở bờ bụi xung quanh với mật độ cao. Dự kiến trong thời gian tới châu chấu tre lưng vàng tiếp tục phát sinh, gây hại tại các rừng tre, nứa, vầu, các ruộng lúa, ngô khác.

Do vòng đời châu chấu tre lưng vàng dài, thời gian sống và phá hại khoảng 5 - 6 tháng trong năm, châu chấu trưởng thành có thể bay xa 40 - 60 km, di chuyển nhanh thành từng đàn và sức tàn phá lớn, rất khó kiểm soát. Khi hết thức ăn trên rừng chúng có thể di chuyển đến phá hại trên các cây trồng khác gần bờ rừng như ngô, lúa, cỏ chăn nuôi... hoặc bay sang các rừng khác.

Dự báo, giai đoạn cuối vụ Xuân và vụ Mùa năm 2024, có nguy cơ cao châu chấu phát sinh, lây lan gây hại diện rộng.

Để chủ động trong công tác phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu tre lưng vàng gây ra, UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các xã, thôn chưa phát hiện có châu chấu cần phải tăng cường tổ chức điều tra, theo dõi, dự báo khả năng phát sinh phát triển của châu chấu tre lưng vàng để chủ động phương án phòng, trừ kịp thời, ngăn chặn phát sinh gây hại trên diện rộng.

2. Đối với các xã, thôn có châu chấu tre lưng vàng xuất hiện và gây hại cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân tăng cường kiểm tra các diện tích rừng vầu, nứa, tre, luồng trên địa bàn; phát hiện và phòng trừ hiệu quả các ổ dịch.

Tăng cường điều tra, xác định hướng và vị trí di chuyển, phạm vi hoạt động và loại cây trồng bị châu chấu gây hại nặng.

3. Biện pháp phòng trừ châu chấu tre lưng vàng

- Phát quang đôi rừng, diện tích lúa, ngô ven rừng bị châu chấu gây hại.
- Phát hiện sớm ổ châu chấu mới nở, còn co cụm mật độ thấp thì dùng vợt bắt thủ công đem tiêu hủy.

- Khi mật độ châu chấu cao hoặc có nguy cơ di chuyển xuống gây hại ruộng lúa, ngô cần khoanh vùng tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Gà nòi 95SP, Patox 95SP, Wavotox 585 EC, Wamtox,...

- Nên tổ chức thành các tổ, đội dịch vụ phun tập trung, dùng bình phun ắc quy hoặc máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch, phun cuốn chiều từng khu vực để tiêu diệt tránh để chúng phát tán gây hại trên diện rộng rất khó kiểm soát.

***Lưu ý:** Phun thuốc vào buổi (sáng sớm hoặc) chiều mát; trong quá trình phun thuốc, cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như: Quần áo, ủng, mũ, kính mắt, găng tay; phải cấm biển báo khu vực mới phun thuốc đảm bảo an toàn cho người và động vật; Cách phun hiệu quả nhất là phun bao vây (chủ động nhân lực phun đồng loạt) từ các hướng trở vào để đạt hiệu quả cao.*

Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: HU, HòND huyện;
- UB MTTQ và các Tổ chức CT-XH huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng NN và PTNT huyện;
- Trung tâm DVNN huyện;
- Trung tâm VH TT và TT; (Đưa tin)
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TTDVNN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Chung

