

Số: /UBND-KT
V/v chủ động phòng chống đói,
rét cho vật nuôi vụ Đông - Xuân
2025 - 2026

Bình Gia, ngày tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 5179/SNNMT-CNTSTY ngày 17/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi vụ Đông - Xuân 2025-2026.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia không khí lạnh và rét đậm, rét hại, hoạt động mạnh trong tháng 12/2025-01/2026; rét đậm, rét hại có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025. Vì vậy, các địa phương cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc, có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

Để chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ Đông - Xuân 2025 - 2026, đồng thời bảo đảm phát triển chăn nuôi, hoàn thành kế hoạch 2025, Ủy ban nhân dân xã Bình Gia yêu cầu các Trưởng thôn triển khai một số nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai phòng chống đói, rét cho vật nuôi

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi về các biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi, cụ thể như:

- Đưa vật nuôi từ rừng, lân lũng về nuôi nhốt tại chuồng để quản lý, chăm sóc tại chỗ.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi. Không để người dân chủ quan, bị động trong việc thực hiện các biện pháp ứng phó.

Phối hợp với thú y viên thường xuyên kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi để có biện pháp phòng chống kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.

- Hướng dẫn thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; khuyến cáo người chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan Thú y.

- Phổ biến, tuyên truyền những kinh nghiệm hay trong công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi.

- Xây dựng phương án ứng phó kịp thời khi thời tiết rét đậm, rét hại xảy ra.

2. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi

2.1. Chuồng trại

- Chủ động gia cố, che chắn chuồng trại những ngày mưa rét, đảm bảo chuồng trại kín ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm ướt nền chuồng. Nền chuồng đảm bảo luôn khô, ráo và phải có chất độn chuồng bằng các nguyên vật

liệu sẵn có tại địa phương như: rơm, rạ, mùn cưa hoặc trấu khô.

- Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, nhiệt độ xuống thấp dưới 12°C , có thể sử dụng bóng điện sưởi hoặc sử dụng chất đốt (củi, trấu, mùn cưa...) để đốt, sưởi ấm cho gia súc trong chuồng. Chú ý quản lý tốt nguồn lửa, tạo khoảng cách giữa đồng củi đốt, đồng dấm đang cháy với các loại vật liệu dễ bắt cháy nhằm phòng ngừa hỏa hoạn, gây bỏng, ngạt đối với vật nuôi trong chuồng.

- Khuyến khích các hộ chăn nuôi xây dựng hố ủ phân riêng vừa hạn chế mầm bệnh, đồng thời giữ sạch môi trường; xây hầm Biogas để xử lý nguồn phân thải, tận dụng nguồn khí đốt sinh học, bảo vệ môi trường.

2.2. Chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi

- Khẩn trương tạo nguồn thức ăn dự trữ bằng cách tận thu các loại phụ phẩm nông nghiệp (rơm khô, cỏ khô, cây ngô, cây lạc...). Tăng cường chăm sóc cây làm thức ăn chăn nuôi (cỏ voi, cỏ VA06...) tạo nguồn thức ăn thô xanh giàu dinh dưỡng.

- Chế biến thức ăn ủ chua, rơm ủ Urê để bổ sung dinh dưỡng cho trâu, bò qua Đông. Chuẩn bị thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...) và Vitamin để cung cấp đủ dưỡng chất cho vật nuôi trong những ngày nhiệt độ thấp, giá lạnh.

2.3. Chăm sóc nuôi dưỡng

a) Đối với trâu, bò

Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp đối với trâu, bò già, yếu, bê nghé non để tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh. Trong những ngày giá lạnh, tăng cường chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, cho trâu, bò ăn đủ lượng thức ăn thô xanh (cỏ tươi, cỏ ủ chua, rơm khô, rơm ủ Urê...) và thức ăn tinh (bột ngô, bột sắn, cám gạo, cháo). Đảm bảo khẩu phần cho mỗi con trâu, bò với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể (ví dụ cho ăn 30 kg cỏ xanh hoặc cỏ ủ chua đối với con trâu, bò có trọng lượng 300 kg), 3 - 4 kg rơm khô, cỏ khô, 1,5 - 2,0 kg thức ăn tinh. Cung cấp đủ nước uống cho trâu, bò hàng ngày khi nuôi nhốt trong chuồng những ngày rét đậm, rét hại; có thể bổ sung cho trâu, bò uống nước ấm có hoà muối với lượng khoảng 5g/100 kg khối lượng cơ thể để tăng cường sức đề kháng. Khi trâu bò bị đói rét do rét đậm, rét hại kéo dài trên 10 ngày liên tục thì sức đề kháng bị giảm dễ mắc bệnh, vì vậy trong thời gian này cần cho trâu bò ăn cháo hoặc bổ sung khoáng chất và các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng.

b) Đối với lợn

Khẩu phần ăn phải đảm bảo, đầy đủ chất dinh dưỡng (có thể cho ăn tự do, ăn các bữa trong ngày tùy vào loại thức ăn, phương thức nuôi). Bổ sung thêm vitamin, men tiêu hóa thường xuyên cho lợn. Cần sử dụng bóng úm, chuồng úm cho lợn con theo mẹ; cho lợn con tập ăn sớm để tăng khả năng tiêu hóa.

c) Đối với gia cầm

Trong những ngày rét đậm, rét hại, chủ động tăng lượng thức ăn, uống nước ấm và bổ sung một số loại vitamin, men tiêu hóa, chất điện giải nâng cao sức đề kháng cho gia cầm, đặc biệt là gà; Có mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ: 6-8 con/m²; gà thịt: 8-10 con/m² giúp cho gà điều chỉnh nhiệt độ cơ thể tốt hơn. Thực hiện tốt quy trình úm cho gà con; những ngày giá rét không thả gia cầm ra vườn, đồi; thực hiện che chắn để tránh gió lùa trong chuồng.

2.4. Chế độ chăn thả

Không thả ngoài trời khi nhiệt độ xuống dưới 12⁰C. Khi thời tiết có nắng, thả trâu, bò ra khỏi chuồng khi mặt trời lên cao, lùa về chuồng trước khi tắt ánh nắng mặt trời.

2.5. Vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chuồng trại; thu dọn các vật dụng không cần thiết ra khỏi khu vực chăn nuôi. Phát dọn bờ cây, bụi cỏ; khơi thông cống rãnh thoát nước. Phun thuốc sát trùng khu vực chăn nuôi theo định kỳ. Rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi; tạo hố sát trùng trên lối ra vào khu vực chăn nuôi nhằm cách ly mầm bệnh đối với vật nuôi.

- Thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh theo lịch của cơ quan Thú y. Chủ động tẩy giun, sán để nâng cao sức đề kháng cho trâu, bò.

- Phòng chống bệnh cước chân trâu, bò: Trong điều kiện thời tiết có nhiệt độ thấp kéo dài, trâu bò thường hay xảy ra bệnh cước chân. Biểu hiện: da móng chân trâu bò bị sưng phù, nứt nẻ, có hiện tượng xung huyết, sờ thấy nóng. Trường hợp bệnh nặng lớp biểu bì ở chân có chảy dịch màu vàng, tạo vết loét, gây nhiễm trùng, nếu không điều trị kịp thời tổ chức dưới da bị hoại tử làm cho con vật bị què, nặng hơn trâu, bò có thể kể phát các bệnh truyền nhiễm khác. Trường hợp trâu, bò bị cước chân cần tăng cường giữ ấm cho trâu bò, giữ nền chuồng khô ráo, cho ăn uống đầy đủ thức ăn thô xanh, bổ sung thức ăn tinh muối khoáng, vitamin. Khi mới xuất hiện cước chân có thể dùng gừng giã nhỏ hoà với rượu để xoa bóp hàng ngày; đồng thời cho trâu bò vận động tại chuồng hoặc đi xung quanh chuồng, quanh nhà vào buổi trưa khi thời tiết ấm hơn để tăng cường tuần hoàn máu tại chân, tránh hiện tượng sưng phù bệnh càng thêm nặng. Khi bệnh nặng cần báo cán bộ Thú y để điều trị bằng kháng sinh.

- Thường xuyên theo dõi tình trạng vật nuôi trong chuồng. Khi thấy có biểu hiện khác thường (ủ rũ, bỏ ăn...) cần nuôi nhốt cách ly để theo dõi. Khi thấy nhiều con vật nuôi cùng có những triệu chứng khác thường cần báo ngay cho Thú y viên hoặc Phòng Kinh tế xã để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Tuyệt đối không giấu dịch; không bán chạy vật nuôi mắc bệnh; không vứt bừa bãi xác vật nuôi ra ngoài môi trường.

Ủy ban nhân dân xã Bình Gia yêu cầu các Trưởng thôn quan tâm, triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Phó CT MTTQ - Chủ tịch Hội nông dân xã;
- VP HĐND và UBND xã;
- Thú y viên xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Nam